

**Контактные адреса
и телефоны, обратившись
по которым, Вы можете
получить ответы
на интересующие Вас
вопросы и помощь
специалиста:**

**ГБУЗ «Тверской областной
клинический наркологический
диспансер»**

г. Тверь, ул. Королёва, д. 10.
Тел.: 51-52-80, 51-52-38, 72-13-80,
51-59-01, 50-44-44

**ГБУЗ «ТОКНД», отделение
медико-психологической
помощи для детей
и подростков**

г. Тверь,
Перекопский переулок, д. 13.
Тел. 555-195

ГБУЗ «ТОКНД», стационар


г. Тверь,
Санкт-Петербургское шоссе, д. 50.
Тел.: 55-94-85, 55-42-77

Телефон поддержки 559-590

E-mail: tverond@mail.ru
Сайт: tverond.parking.ru
Код города 8 (4822)



Средства для издания
данной печатной продукции
выделены в рамках реализации
долгосрочной целевой
программы «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами,
психотропными веществами
и их незаконному обороту
в Тверской области
на 2010–2012 годы».



**ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА
ПРИЗНАКОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ**

Вещество		Происхождение	Внешний вид	Способ использования	Непосредственное действие	Вредное воздействие (при систематическом употреблении)
Каннабис	Гашиш	Смолообразная смесь экстракта цветов индийской конопли и связующего вещества	Коричневые, черные, зеленоватые пластинки или крошки	Курение самокрутки или трубки, в чае или в выпечке, употребление в чистом виде	Эйфория, разговорчивость, оживленность, самоустраненность, чувство нового понимания себя, сонливость, паника, отклонения в ощущении времени и пространства	Накапливается в организме, в т. ч. в нервных клетках, вызывает пассивность, психические расстройства и расстройства памяти, ослаблена способность сосредоточиться и мыслить логически, добиваться каких-либо результатов, ослаблены творческие способности, опасен во время движения
	Марихуана	Сушеный помол экстракта цветов индийской конопли и его побегов	Зеленовато-коричневые волокна или семена	Курение самокрутки или трубки	То же, что и гашиш	То же самое, что и гашиш. Риск попадания в зависимость сравним с зависимостью при курении табака
ЛСД (лизергид, диэтиламид лизергиновой кислоты)		Изготовлено химическим путем. Дозы в долях миллиграмма	Разноцветные маленькие таблетки или бесцветный раствор, которым пропитаны небольшие цветные промокательные бумажки с рисунками	Употребление в чистом виде или растворенным в жидкости через рот	Слуховые и зрительные галлюцинации, отклонения в понятии «личность», возникновение чувства ощущения себя со стороны, преувеличение чувства собственного достоинства, приподнятое настроение, подавленность, паника, психическое расстройство	Самопроизвольные галлюцинации, вспышки психического расстройства, попытки самоубийства при галлюцинациях. Риск зависимости
Амфетамины (и родственные вещества: предулин и риталин), экстази		Изготовлено химическим путем	Таблетки или капсулы разной величины, порошок или раствор	Введение внутривенно, а также проглатывая	Эйфория, возбуждение, длящееся часами, которому присущи элементы, схожие с сексуальным удовлетворением, нервозность, галлюцинации, бессонница, потеря аппетита, иллюзия самоуверенности	Нарастающее желание получить дополнительную дозу, психическое расстройство, агрессивность, риск кровоизлияния в мозг, смерть от передозировки, организм перевозбужден. Сильная зависимость
Кокаин		Изготовлено из листьев кокаинового куста	Белый порошок	Вдыхая или выкуривая, реже внутривенно	То же, что и амфетамин, но воздействие более кратковременно	То же, что и амфетамин
Технические растворы: растворители, лак, клей, чистящие в-ва, бензин и т. д.		Химически изготовленные вещества или продукты нефтепереработки	Стандартная упаковка	Через дыхательные пути с воздухом, вдыхая из пакета или с лоскуточка ткани	Эйфория, сумбурность, временный уход от повседневных проблем, бредовое состояние, головная боль, раздвоение в глазах, риск ухудшения работы и остановки сердца	Падение духовного уровня, заболевания почек и печени, отравления, агрессивность, зависимость
Снотворные и успокаивающие лекарственные средства		Изготовлено химическим путем	Таблетки различной величины и цвета, растворы и капсулы	Принимая через рот большими дозами, а также с алкоголем	Усталость, сумбурность, томность, равнодушие, преуменьшение проблем, замедленная речь, неуверенные движения, алкоголь увеличивает воздействие	Стойкая зависимость, длительный и тяжелый абстинентный синдром, рвота, дрожь, бессонница, судороги, употребление с алкоголем вызывает бредовое состояние и отравления, риск самоубийства
Опиаты (опиум, кодеин, морфин, героин)		Из опиумного мака выделяют морфин, героин – это продукт переработки морфина	Таблетки различной величины, жидкость или порошок	Внутривенно, вдыхая, выпивая или выкуривая	Эйфория, утомленность, иллюзия самоудовлетворенности, легкая потеря аппетита, сужение зрачков	Стойкая зависимость и непреодолимое желание к устойчивому употреблению. Растущая потребность получить дозу. Явные физические признаки абстинентного синдрома, боли в мышцах и костях, гриппозное состояние, расстройство желудка. Риск остановки дыхания при передозировке